

## Section 8.

# 脱線：ざっくり宇宙物理学

8.1 様々なエネルギー・スケール

8.2 天体の質量スケール

# この講義の目標

- これまで学んできた物理を総合的に用いて、恒星の性質と進化を理解する
- 天文学研究を行うのに必要な恒星進化論の基礎を理解する

3年間物理を頑張った人へのご褒美  
物理を使って、宇宙を生き生きと理解する

# 天体の性質を決めるもの


- 主系列星の場合
  - 重力の強さ ( $G$ ) <= 力のつり合い
  - 電磁気力の強さ ( $e$ ) <= クーロン障壁
  - 量子力学の効果 ( $h$ ) <= トンネル効果





# 最小の仮定

gravitational constant	$G$	$6.674\ 30(15) \times 10^{-8} \text{ cm}^3 \text{ g}^{-1} \text{ s}^{-2}$
speed of light in vacuum	$c$	$2.997\ 924\ 58 \times 10^{10} \text{ cm s}^{-1}$
Planck constant	$h$	$6.626\ 070\ 15 \times 10^{-27} \text{ erg s}$
electron charge	$e$	$4.803\ 26 \times 10^{-10} \text{ esu} (= \text{dyn}^{1/2} \text{ cm})$
electron mass	$m_e$	$9.109\ 383\ 7015(38) \times 10^{-28} \text{ g}$
	$m_e c^2$	$510.998\ 950\ 00(15) \text{ keV}$
proton mass	$m_p$	$1.672\ 621\ 923\ 69(51) \times 10^{-24} \text{ g}$
	$m_p c^2$	$938.272\ 088\ 16(29) \text{ MeV}$

天体の性質(例えば質量)は  
これらの基礎定数で大雑把には表せるはず



# スピン-軌道相互作用



<https://astro-dic.jp/sodium-d-line-na-d-line/>

# レポート課題 4

## 4-1. 重力のエネルギー

- 理想気体のエネルギー + 縮退電子のエネルギー (非相対論的)  
として、粒子数密度の関数で温度の変化を図示し、  
最高到達温度の表式を求めよ。

## 4-2. 最高到達温度が核融合可能な温度 (エネルギー・スケール)に 達するという条件から、

核融合を起こす星(主系列星)の下限質量を

- 陽子・電子の質量
- 微細構造定数と重力微細構造定数  
で書き表し、質量を概算せよ。